

Tekst: Gerwen Pelgrum

Foto's: PVM

AANLEG VAN WILDAKKERS

De maand maart is een mooie tijd om eens na te gaan denken om wat diversiteit in uw jachtveld aan te brengen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door het aanleggen van een wildakker. Het zal jagers en wildbeheerders niet onbekend zijn, dat door biotoopverbeterende maatregelen in het jachtveld de aantrekkingskracht voor wild sterk verbeterd kan worden. Het is niet alleen zaak om wildakkers aan te leggen op plaatsen waar gejaagd wordt. Ook in zgn. rusthoeken en vooral in velden waar veel roodwild zit is dit belangrijk. Roodwild is namelijk erg gevoelig voor verstoring.

Door de grootschalige en vaak intensieve vorm van landbouw blijft er vaak minder voedselaanbod en schuilmogelijkheid voor het wild over. Dit geldt vooral in de wintermaanden en dan vooral voor het kleinwild. Een wildakker kan ook helpen bij het voorkómen van schade aan land- en bosbouw. Denk vooral ook aan schilshade in het bos. Door monocultuur in de bosbouw (bijvoorbeeld grove den zonder ondergroei) ontbreekt voedselaanbod. We zien dit vooral in voormalig Oost-Duitsland.

Daarom is het verstandig om uw jachtveld eens goed te bekijken of en zo ja waar er een wildakker aangelegd kan worden. Als er landbouwgronden in uw veld liggen, praat dan ook eens met de plaatselijke boeren. Zij hebben vaak nog wel eens een hoekje of strookje grond over waar een (kleine) wildakker kan worden aangelegd. Ook overleg vooraf met de verhuurder van uw jachtveld is natuurlijk zeer aan te bevelen. Ook het aanleggen van zoelplaatsen, uiteraard voor zover de omstandigheden dat toelaten, is gewenst en bevordert tevens de aantrekkingskracht op wild.

April en mei zijn de maanden om wildakkers aan te leggen. Juli en augustus zijn bij uitstek geschikt om wintermengsels in te zaaien met bladkoolgewassen.

Waar leg ik een wildakker aan?

Het succes van een wildakker begint altijd met een goede voorbereiding. Een goede inventarisatie van de terreinomstandigheden is natuurlijk erg belangrijk. Zoek bij voorkeur naar zonnige plekken in uw jachtveld, met 3 à 4 uur zon per dag. Hoe meer zonlicht een plant krijgt, hoe meer suikers hij maakt en zulke planten zijn geliefd bij grofwild. Dit zijn namelijk fijnproevers. U kunt ook wildakkers aanleggen op brandgangen, langs akkerranden of op open plekken in het bos waar voldoende licht komt. Ook kan vaak in de berm naast bospaden b.v. een grasklavermengsel ingezaaid worden.



Gerwen Pelgrum

Werkzaam bij PVM in Lobith als verkoper voor o.a. Wildakker-mengsels

Groothandelsbedrijf in;

- Plantsoen
- Wildakker - floramengsels en graszaden
- Boomzaden
- Materialen voor bos en landschapsbouw

Hobby's: Jagen, vissen en buiten in de natuur bezig zijn.



Het loof van de plant wordt graag opgenomen door het grofwild.



Ook in de winter is de knol van de topinamboer erg in trek.



Hoe groot moet zo'n wildakker zijn?

Om u een idee te geven: voor ree- en kleinwild kunt u denken aan 200 tot 400 m², voor grofwild mag dat wat groter zijn, b.v. 200 tot 1000 m². Ik geef echter de voorkeur aan meerdere kleine wildakkers. Als er dan toch voor een grote akker gekozen wordt, dan raad ik aan hierop meerdere mengsels in te zaaien, zodat de akker het gehele jaar interessant voor het wild is.

Bodemvoorbereiding, inzaai en bemesting

Zorg in elk geval voor een goed zaaibed. De oude zode dient verwijderd te worden door middel van onderploegen of frezen. Het zaaien van kleine hoekjes kan het beste handmatig gebeuren. Wel is het dan zaak, dat de zaden ingewerkt worden met een hark, anders

zijn de vogels er mee weg of droogt het zaad uit en kiemt niet meer.

Als de akkers wat groter van omvang zijn is machinaal inzaaien natuurlijk veel gemakkelijker. Wellicht heeft de plaatselijke boer of loonwerker wel een zaaimachine. Bosgrond is meestal erg schraal, daarom is het aan te bevelen om de grond ook extra te bemesten. Stalmest en champignonmest bevorderen de hoeveelheid organische stof waardoor de grond beter vocht vasthoudt. Na inzaai kan ook kunstmest gebruikt worden, bijvoorbeeld NPK 12-10-18.

Mengselkeuze

Bij het bepalen van de mengselkeuze moet u zich altijd afvragen: Voor welke wildsoorten ga ik de akker aanleggen en in welke periode van het jaar wil ik voedsel aanbieden? Wildakkermengsels zijn meestal 2- jarig,


wildweidemengsel zijn 2 tot 5 jarig bij goed onderhoud. Als de wildakker voor roodwild aangelegd wordt, dan kan het beste voor een mengsel zonder granen gekozen worden, want als er granen in het mengsel zitten, dan weten de wilde varkens daar wel raad mee. Grasklavermengsels zijn ook aan te bevelen. Deze mengsels bevatten breedbladige grassen en verschillende klaversoorten. Breedbladige grassen vormen het hoofdvoedsel voor zwartwild. Roodwild heeft in het voorjaar veel eiwitten nodig. Dit halen de dieren o.a. uit grassen. Het rood-, ree-, dam- en muffelwild is verzet op klaversoorten. Deze worden vooral opgenomen in de zomerdag wanneer ze suikers bevatten. Het plaatsen van likstenen is sowieso ook aan te bevelen, wel moet er dan drinkwater in de buurt zijn.

Topinamboer

Dit is ook een gewas, dat niet mag ontbreken op de wildakker. De poottijd is bij voorkeur in april. Het loof van de plant wordt graag opgenomen door het grofwild. Het wordt twee tot drie meter hoog en biedt daarnaast dus ook volop dekking. Het wild kan hierin mooi zeker en op het gemak uittreden. Bij een hoge zwartwildstand is het raadzaam om in de beginperiode een stroomdraad te zetten rondom de wildakker.

Ook in de winter is de knol van de topinamboer erg in trek. Als door middel van een schijveneg de knollen naar boven worden gehaald, dan kan het wild de knol goed opnemen. Als er dan van tevoren ook nog eerst wat maïs wordt uitgestrooid en daarna mee in de grond wordt gewerkt, dan is dit een ideale voerplaats voor het zwartwild. De varkens zijn er lange tijd mee bezig, voordat de maïs op is. Ook lopen zij wat meer verspreid over de akker, zodat het aanspreken en schieten ook gemakkelijker wordt.

Wordt vervolgd 🐾



PVM

Energieweg 2a

6915 SB Lobith

Tel 0316-566118

Mail: gerwenpelgrum@pvmbv.com

Website: www.pvmbv.com