



EEN BETERE BIOTOOP BEGINT

BIJ JEZELF

Tekst en foto Jeroen Koorevaar

Heeft u ook een eenvoudig uit te voeren maatregel om de biotoop te verbeteren? Mail uw tip naar redactie@koninklijke-jagersvereniging.nl o.v.v. biotooptip en wellicht wordt uw tip in een volgende editie vermeld. U ontvangt dan een zaadmengsel met inheemse soorten voor de aanleg van een stukje bloemrijk grasland of akkerrand.

Het agrarisch cultuurlandschap verliest door schaalvergroting steeds meer kleine elementen. Ruigten, struiken, heggen, wildakkers en faunaranden bieden dekking en voedsel voor het wild en vele andere diersoorten. In overleg met de grondgebruiker kan vaak met een kleine ingreep het landschap aantrekkelijker worden gemaakt voor de fauna. Ecoloog Jeroen Koorevaar geeft praktische tips.

Wat ga ik doen?

Bramen zijn een lekkere versnapering wanneer je op post zit naast een braamstruik of tijdens een ronde door het veld. Door het grote blad, lange stengels en scherpe stekels zijn braamstruiken mooie schuilplekken voor kleine zoogdieren en vogels tegen predatoren. Een aantal soorten nachtvlinders, kevers en wespen gebruikt het blad van de braam om eieren op af te zetten en als voedsel voor de larven. Van mei tot en met augustus bloeit de braam, waardoor deze interessant wordt voor hommels en bijen. Ongeveer vanaf augustus zijn de vruchten rijp.

Voor welke soorten?

Braamstruwelen zijn een oase voor kleine fauna in vaak kale landschappen. De insectenrijkdom maakt het een goede plek voor vogels om voedsel te zoeken voor de jongen. Ook vleermuizen profiteren van de insectenrijkdom van het braamstruweel bij het uitvliegen van nachtvlinders en kevers. De vruchten vormen voedsel voor onder andere lijsterachtige vogels en kleine zoogdieren. Fazanten kiezen vaak struwelen om in te broeden.

Waar?

Een braam is weinig kieskeurig als het om de bodem gaat. Van nature komt de braam voor op natte en droge gronden, op verwaarloosde of bemeste plekken langs singels en wallen. De braam komt het beste tot zijn recht op een zonbeschenen plek, al groeit deze ook prima in de halfschaduw. Mits de braamstruik goed bijgehouden wordt, heeft deze niet heel veel ruimte nodig. De ruimte naast een hek op een dammetje of een overhoekje is voldoende.

Wanneer?

Voor het aanplanten van braamstruiken is niet veel nodig. Eén of enkele gestekte braamstruiken, een schep en wat compost.

Weidevogelgebied

Houd er wel rekening mee dat in weidevogelgebied het vrije zicht van 400m tot 600m niet onderbroken wordt. Dit vrije zicht heeft de grutto nodig om predatoren op tijd te kunnen zien en zich daardoor veilig genoeg te voelen om ergens te gaan nestelen.

Kies bij voorkeur geen gecultiveerde of gekruiste braamstruik, maar voor de inheemse gewone braam, *Rubus fruticosus*. Deze kan het beste van een andere wilde braamstruik worden gestekt. Wanneer een scheut van een braamstruik in augustus/september in niet te vaste grond wordt geleid, zal deze wortels vormen. Het volgende voorjaar kan de stengel worden losgeknipt van de struik en de stek voorzichtig worden uitgegraven. De struik kan het beste worden aangeplant in maart - april.

Hoe ga ik te werk?

Graaf een gat in de grond waar de wortels van de braamstruik ruim inpassen. Vul het gat op met een mengsel van compost en de aarde die bij het graven van het gat is vrijgekomen. Zorg ervoor dat de groei van de struik wordt begeleid. Zonder snoeien en geleiding van takken, zal de struik gaan woekeren. Wanneer takken de grond raken, kunnen deze wortel schieten. Deze verbraming is niet overal wenselijk. Hoe groot de struik mag worden is afhankelijk van de beschikbare ruimte en de beperkingen die er zijn door het landgebruik. Zet zo mogelijk wat struiken bij elkaar. Een struweel levert meer op dan een enkele struik. Gesnoeid kan worden in het najaar of in het vroege voorjaar. Door de takken te vlechten of op te binden, kan worden voorkomen dat deze de grond raken en wortelen. •