

# Fitte

## REBHÜHNER RICHTIG FÜTTERN

Wie man den Hühnern helfen kann, hat der Verband Deutscher Falkner erprobt. Der Schlüssel sind Fütterungen. Die Erfolge können sich sehen lassen. André Maslo berichtet.



# Feld

# Hühner

**Im Sommerhalbjahr** empfiehlt sich das den, da die Schützsuchenden Kettenten auch das linnere niedrigere Gebüschgruppen als Tagess- verrosort werden können. So wird die Zelt-, in der sich die Hühner auf freiem Feld zur Futtersuche verluste bei Schneelagern gehen dadurch deut- zeigen müssen, erheblich reduziert. Prädationen- lich zurück. Es hat sich herausgestellt, dass im sehr stabil. Die Wabensuktur ermöglicht eine langeen. Durch das Gefecht steht die Futterrung nur und Kleinvogel können an den Weizen ge- ummöglich, Kommer aufzunehmen. Nur Rebhüh- umgehen werden. Das macht es Schalenwild zu- duzierter. Wichtig ist, dass die Futterrung wird re- die Futterplatze, auf die Fruchtfolie kann schnell scheidende Vorstufe: geringere Nagetiere um- ten Schuttentfernung hat dieser Ansatz ent- Revier gebraucht. Gegenüber der althergebrach- wird mit Hilfe leichter, transporatable Behälter ins und frischere Baustein werden.


**Im Winterhalbjahr** empfiehlt sich die Futterungen und frischere Baustein im menen. Den besonders die Küken schätzen Warme entfällt auf einem freigemachten Stück Altligras, hier ebenfalls. Einige Meter vom Heckennrand

**Wie kann der am stärksten** vom Rückgang kenne darüber und Grabenböschungen. Gelegnute Stanodorte sind Altligrasstellen, He- rresets sind es einfach zu viele Stellen, als dass man einiges Parasitenkonzentrationen, ande- Meter versetzt werden sollten. So vermiedet stehen, die mindestens vierfach um einige Musseien drei bis fünf Futterungen zu Verflügung sprachen gerne an. Pro bestattetem Brutpaar nach einer kurzen Gewöhnungsphase neh- buschel oder Ahornliches befestigt werden.

**effektive Tarnung,** Den an ihr können Altligras-

sehr stabil. Die Wabensuktur ermöglicht eine langeen. Durch das Gefecht steht die Futterrung nur und Kleinvogel können an den Weizen ge- ummöglich, Kommer aufzunehmen. Nur Rebhüh- umgehen werden. Das macht es Schalenwild zu- duzierter. Wichtig ist, dass die Futterrung wird re- die Futterplatze, auf die Fruchtfolie kann schnell scheidende Vorstufe: geringere Nagetiere um- ten Schuttentfernung hat dieser Ansatz ent- Revier gebraucht. Gegenüber der althergebrach- wird mit Hilfe leichter, transporatable Behälter ins und frischere Baustein werden.

**So sieht das bewahre Konzept aus:** Das Futter- entstehendes Baustein werden. sen ausgerichtet, moderat Zufutterung zum eine an modernen Wildbiologischen Kenntnis- und einer effizienten Raubwildbejagung kann Dié Antwort: Neben Biotoptypenungen als er einen neuen, praxistauglichen Hegean- fage des Verbandes Deutscher Falke (VDF), chen zur Verflügung stehen? Das war die Leit- ne Blühsstellen, Brachen oder Auspendelschlaf- derwildlär effektiv geholfen werden, wenn kei- der Biologe ist in der Feldflur beobachten Nie- wie kann der am stärkste vom Rückgang



## Wild - Revierpraxis


Winter- und Sommerhalbjahr etwa gleich viel Futter benötigte wurde. Das unterstreicht noch einmal, wie wichtig es ist, auch in der Reproduktionszeit zuzufüttern.

Die entscheidende Neuerung des Projektes ist die selektive, artgerechte Zugabe von proteinhaltigem Futter

Futtereimer, Drahtgeflecht und Betonplatte – fertig ist die Fütterung (l.). Altgrasbüschel eignen sich zum Tarnen (r.).



### Besatzentwicklung im Projektgebiet



für das Gesperre. Das von uns ausschließlich verwendete, rein pflanzliche BIOLAND-Geflügelaufzuchtfutter wird von Rebhühnern sehr gerne aufgenommen.

**Ab Beginn** der Legeperiode (etwa Anfang Mai) wurde es im Verhältnis von circa einem Teil Aufzuchtfutter zu zwei bis drei Teilen Weizen ausgetragen. Unter jeder Fütterung sollte eine Betonplatte liegen. Das verhindert, dass sich dort durchnässte Kuhlen bilden. Auf dem Stein, der beim Versetzen der Eimer regelmäßig abgefegt und gedreht werden sollte, bleibt das Futter somit stets sauber und trocken.



Foto: Willi Röles



Erhältlich im gut sortierten Jagdgeschäftslandhandel.  
Chevalier Sweden AB Büro Düsseldorf  
FON: 0163-596 5960, www.chevalier.se  
EMAIL: hubertus.knigge@chevalier.se

Eine schnitlige Fleecjacke aus den Händen einer sehr bewussten Kuschlig-wieche Fasern innen. Hier dargestellt mit einer Baumwollhose aus der Vintageline. Diese Kombination ist ideal für einen in der Freizeit. Beide Artikel sind für Damen und Herren erhältlich.

## PRO HOSE VINTAGE FLEECE UND MAINSTONE



Das gilt es zu vermeiden: Im Winter sind Rebhühner auf offenen Flächen ein gefürchtetes Fressen. Futterrungen in der Deckung halten sie davon häufig fern.



Nach einem kurzen Gewöhnungsphase suchen Rebhühner die Futterstellen regelmäßig auf.

Um die wenigen Passenden Hühnerbiotope zu optimieren, wurde im Projektgebiet das Mögliche getan, flankiert von einer intensiven Jagd auf das Raubwild. Effekt erreicht. Den größten Anteil am Bevölkerungsstock gesetzt, Benjieshecken und Ausgewachsene Heckenabschnitte sind auf den Stock vor Jährlingen konnten der Biologe Potts in Großbritannien nachweisen, dass sich die Kükensterblichkeit von 50 Prozent in den 1930er-Jahren auf 70

sich die Landwirtschaftsgenossenschaften erheblich verringert haben. Ebenso erklärte ren entfernt werden. Einmal jährlich wird eine Menge Holz aus Hochstaudenflächen abgetragen und auf die Felder gebracht. Die Ergebnisse sind erstaunlich: Der Anteil an Rebhühnern ist um mehr als 50 Prozent gestiegen. Ein weiterer Vorteil ist die Erhaltung der Biodiversität. Durch die Anpflanzung von Hecken und Bäumen wird die Lebensraumqualität für zahlreiche Tierarten verbessert.



### Hilfe fürs Niederwild

Sie wollen mehr über die richtige Hege und Bejagung von Rebhuhn, Fasan und Feldhase erfahren? Dann ist die neue Ausgabe von WILD UND HUND-Exklusiv für Sie perfekt.

Sie ist ab 21. Mai auf [www.wildundhundshop.de](http://www.wildundhundshop.de) und im Handel erhältlich.



Fitte Junghühner: Gerade ihre Kondition lässt sich durch die zusätzliche Weizengabe erhöhen.

Prozent erhöht hatte. Dieser Faktor limitierte die Besätze am stärksten. Über die Hegemaßnahmen im Rahmen des Projektes ist es uns gelungen, der Tendenz deutlich entgegenzuwirken.

Bei einer von uns erreichten durchschnittlichen Kettenstärke von zehn Rebhühnern haben acht Küken das Erwachsenenalter erreicht – also über 50 Prozent eines Geleges von 15 Eiern. Die Zufütterung konnte selbst schlechtes Wetter – ein heikler Faktor auch in

optimalen Habitaten – bis zu einem gewissen Grad ausgleichen.

**Das VDF-Rebhuhnprojekt** in Südniedersachsen hat gezeigt: Dort, wo sich aller Widrigkeiten zum Trotz heute noch Rebhühner halten können, kann man sie mit moderater Fütterung in ihrem Besatz vervielfachen, ohne dass die Landwirtschaft größere Zugeständnisse machen muss. Eine nachhaltige Erholung der Art und eine Wiederbesiedlung verwaister Areale ist damit

Im Sommer können Fütterungen offen platziert werden. Besonders Küken schätzen nämlich Wärme.



Photo: Andre Mäslä

Aber auch andere Arten, wie Rotkehlchen, Zaunkönige, Meisen und den Hauptpanzerl stellten. oft in Gruppen von über 30 Vögeln – Amselflm bis hin zu durchziehenden Heidelerchen, nutzten die Futterruten regelmäßig. Rebhühner als Hengst des Futters, das verbliebene Drittelf wurde überwiegtend von Mausen konsumiert. Die Nagetiere und das mit auch die Raubwildkonzentration waren an den Futterungen somit bedeutend geringer als an konventionellen Schütten.



Wildkämeras finden Sie auf [www.verbund-deutschscher-falkner.de](http://www.verbund-deutschscher-falkner.de). Videos und Bilder der

klass vor allem auch Kleinvögel stark bei Goldammern und Feldsperlingen – von den Magannahmen profitieren, wo möglich. Positiver Nebeneffekt: Nach drei Projektfällen mit intensiver Wildkamera-Uberwachung lässt sich sagen,

sollte man drei bis vier Futterungen vorsehen. Henne (l.) und Hahn am Deckungsrand: Pro bestattigtem Paar

