

## REE MET LIESBREUK

Op 27 juli schoot Marcel Nagtegaal deze naar schatting driejarige bok.

De conditie van de bok was normaal. Aangezien zowel Nagtegaal als zijn buurjagers dit ree nooit eerder hadden gezien, vermoedt hij dat het dier behoorlijk heimelijk heeft geleefd. We legden de foto voor aan wildziektespecialist dr. Sjeng Lumeij.

*'Een vergroot scrotum kan worden veroorzaakt door een verzwakking van de buikwand waardoor een deel van de darmen of buikvet door de buikwand tot onder de huid kan komen. Deze afwijking kan aangeboren of verkregen zijn. Bij een indirecte liesbreuk is het lieskanaal na afdaling van de testikels niet volledig gesloten, waardoor de darmen door deze opening naar het scrotum kunnen afzakken. Deze vorm wordt beschouwd als aangeboren. Bij een directe liesbreuk komen de darmen door de buikwand via een plaatselijke verzwakking. Dit kan op latere leeftijd optreden. De afwijking op de foto hoeft dus niet lang aanwezig te zijn geweest. Ook kan er sprake zijn van vocht-ophoping in het scrotum (hydrocele). Een hernia scrotalis wordt pas gevaarlijk voor het dier als er sprake is van een gedeeltelijke of*



*volledige inklemming van de darmen. Andere ruimte innemende processen in dit gebied kunnen verwarring geven, zoals een abces, een bloeditstorting of een vergrote lymfeklier. Voor een exacte diagnose is nader onderzoek nodig.'*

### VELDWAAR NEMING

Heeft u ook een interessante waarneming gedaan? Stuur u foto met een kort verslag o v v